

Secura Varnish®

Seite 2 - de: Gebrauchsanweisung

Page 3 - en: Instructions for use

Page 4 - fr: Manuel d'instruction

Página 5 - es: Instrucciones de uso

Pagina 6 - it: Istruzioni per l'uso

Strana 7 - bs: Uputstvo za upotrebu

Pagină 8 - ro: Instrucțiuni de utilizare

Sayfa 9 - tr: Kullanma kılavuzu



We know how

Gebrauchsanweisung

Patientenzielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Patienten

Vorgesehener Anwender

Zahnarzt

Zusammensetzung

Qualitative Angaben:

Nitrocellulose, Triethylcitrat, Ethylacetat

Quantitative Angaben in % G/G:

Nitrocellulose 15

Zweckbestimmung des Produkts

Versiegelungslack

Indikationen

Secura Varnish dient der Oberflächenversiegelung von Glasionomern und -zementen.

Kontraindikationen

Nicht bei bekannter Allergie gegen einen der Bestandteile verwenden.

Leistungsmerkmale des Produkts

Selbsthärtender Versiegelungslack auf Nitrocellulose-Basis.

Spezielle Vorsorgemaßnahmen

Keine

Anwendung

Nach der Präparation die zu behandelnden Flächen reinigen und gut mit Warmluft trocknen. Secura Varnish tropfenweise auf das Applikationsinstrument übertragen und schnell applizieren. 30 Sekunden mit Warmluft trocknen und Applikation wiederholen.

Warnhinweise**Restrisiken**

Die in der zum Produkt gehörenden Gebrauchsanweisung beschriebenen Verarbeitungshinweise sowie Vorsichtsmaßnahmen sind in jedem Fall zu beachten. Sollte es trotz Einhaltung dieser Hinweise zu einer unerwünschten Reaktion beim Patienten kommen oder sonstige unerwünschte Vorkommnisse eintreten, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter möglichst genauer Beschreibung der Begleitumstände.

Nebenwirkungen

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt. In Einzelfällen ist eine Hypersensitivität gegen Komponenten des Materials nicht auszuschließen. Hautkontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt sofort mit Wasser und Seife waschen. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

Sollten Ihnen unerwünschte Nebenwirkungen – auch in Zweifelsfällen – bekannt werden, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter möglichst genauer Beschreibung der Begleitumstände und Symptome.

Risiken bei einer Überdosierung sind nicht bekannt.

Risiken bei der Anwendung: keine offene Flamme bei der Anwendung! Das Lösemittel ist brennbar.

Wechselwirkungen

Eine Wechselwirkung des Produktes mit anderen Medizinprodukten, Arzneimitteln oder sonstigen Stoffen ist nicht bekannt.

Lagerung

Flasche nach Flüssigkeitsentnahme sofort wieder verschließen, da sonst eine ungünstige Konsistenzveränderung auftreten kann. Das Produkt sollte zwischen 0°C - 22°C gelagert werden.

Mindesthaltbarkeit

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Varianten

[REF] WP4099 1 x 10,0 ml Flüssigkeit

Entsorgung

Nicht verwendetes Material kann nach dem Aushärten durch Verdunsten dem Hausmüll zugeführt werden.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.



We know how

dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48
www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de



Willmann & Pein GmbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9228-0
Fax: +(49) 4123/9228-49
www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



Made in Germany



H319 verursacht schwere Augenreizungen
H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

01.06.2023
2023-REV-010

Instructions for use

Patient target group

Children, adolescents, adults and older patients

Intended users

Dentist

Composition

Qualitative data:

Nitrocellulose, triethyl citrate, ethyl acetate

Quantitative data in % G/G:

Nitrocellulose 15

Intended purpose of the product

Sealing varnish

Indications

Secura Varnish is used to seal the surface of glass ionomer cements.

Contraindications

Do not use if there is a known allergy to any ingredient.

Performance characteristics of the product

Self-curing nitrocellulose-based sealing varnish.

Specific precautions

None

Application

After preparation, clean the surfaces to be treated and dry well with warm air. Transfer Secura Varnish drop by drop to the application instrument and apply quickly.

Dry with warm air for 30 seconds and repeat application.

Warnings**Residual risks**

The processing instructions and precautionary measures described in the instructions for use accompanying the product must always be observed. If, despite adherence to these instructions, an adverse reaction occurs in the patient or other adverse events occur, we request that you inform us in any case, describing the accompanying circumstances as precisely as possible

Side effects

No side effects have been reported to date. In individual cases, hypersensitivity to components of the material may occur. Avoid skin contact. In case of accidental contact, wash immediately with water and soap. In case of eye contact, rinse immediately with plenty of water and consult a doctor.

If you become aware of any adverse effects – even in doubtful cases – please inform us and describe the accompanying circumstances and symptoms as precisely as possible.

Risks in case of overdose are not known.

Risks during application: no open flame during application! The solvent is flammable.

Interactions

Interaction of the product with other medical devices, medicinal products or other substances is not known.

Storage

Immediately reseal the bottle after removing the liquid, otherwise an unfavourable change in consistency may occur. The Product should be stored between 0° C - 22°C.

Minimum shelf life

Do not use after the expiry date.

Variants

[REF] WP4099 1 x 10,0 ml liquid

Disposal

Unused material can be disposed of with household waste after curing by evaporation.

All serious incidents related to the device shall be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.



We know how

dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48
www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de



Willmann & Pein GmbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9228-0
Fax: +(49) 4123/9228-49
www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



Made in Germany



H319 Causes serious eye irritation
H224 Extremely flammable liquid and vapour
H336 May cause drowsiness or dizziness

Manuel d'instruction

Groupe cible de patients

Enfants, adolescents, adultes et patients âgés

Utilisateurs prévus

Dentistes

Composition

Données qualitatives :

Nitrocellulose, citrate de triéthyle, acétate d'éthyle

Données quantitatives en % p/p :

Nitrocellulose 15

Finalité du produit

Laque d'étanchéité

Indications

Le vernis Secura est utilisé pour le scellement superficiel, des ciments verre ionomère.

Contre-indications

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des ingrédients.

Caractéristiques du produit

Vernis de scellement auto-durcissant à base de nitrocellulose.

Mesures de précaution spéciales

Aucune

Application

Après la préparation, nettoyer les surfaces à traiter et bien les sécher à l'air chaud. Mettre du vernis Secura goutte à goutte sur l'instrument d'application et appliquer rapidement.

Sécher pendant 30 secondes à l'air chaud puis répéter l'application.

Avertissements et risques résiduels

Les instructions de traitement et les mesures de précaution décrites dans le mode d'emploi accompagnant le produit doivent toujours être respectées. Si, malgré le respect de ces instructions, une réaction indésirable se produit chez le patient ou si d'autres événements indésirables surviennent, veuillez nous en informer dans tous les cas, en décrivant les circonstances les accompagnant aussi précisément que possible.

Effets secondaires

Jusqu'à présent, aucun effet secondaire n'a été observé. Dans certains cas, une hypersensibilité aux ingrédients du produit ne peut être exclue. Éviter le contact avec la peau. En cas de contact accidentel, laver immédiatement à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin. Nous vous invitons à nous faire parvenir une description aussi précise que possible des circonstances si des effets secondaires indésirables apparaissent ou si vous avez des doutes.

Aucun risque connu en cas de surdosage.

Risques liés à l'utilisation : pas de flamme ouverte lors de l'utilisation ! Le solvant est inflammable.

Interactions

Une interaction du produit avec d'autres dispositifs médicaux, médicaments ou autres substances n'est pas connue.

Stockage

Fermez le flacon immédiatement après avoir retiré le liquide, sinon un changement défavorable de la consistance peut se produire. Le produit doit être conservé entre 0° C et 22°C.

Durée de conservation

Ne pas utiliser après l'expiration de la date limite.

Variantes

REF WP4099 1 x 10,0 ml de liquide

Élimination

Le produit non utilisé peut être éliminé avec les déchets ménagers après avoir durci par évaporation.

Tous les incidents graves liés au produit doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



We know how

dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany

Fon: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48

www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de



Willmann & Pein GmbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany

Fon: +(49) 4123/9228-0
Fax: +(49) 4123/9228-49

www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



Attention

Danger

Warning

Danger

Made in Germany



0482

H319 Provoque une grave irritation des yeux
H224 Liquide et vapeur extrêmement inflammables
H336 Peut provoquer somnolence et perte de vigilance.

Instrucciones de uso

Grupo objetivo de pacientes

Niños, adolescentes, adultos y pacientes mayores

Usuarios previstos

Dentista

Composición

Datos cualitativos:

Nitrocelulosa, trietilcitrate, etilacetato

Datos cuantitativos en % G/G:

Nitrocelulosa 15

Finalidad del producto

Sellador

Indicaciones

Secura Varnish se utiliza como sellador superficial, de cementos de ionómeros de vidrio.

Contraindicaciones

No utilizar en caso de alergia a alguno de sus componentes.

Características del producto

Sellador autopolimerizable a base de nitrocelulosa.

Medidas preventivas especiales

Ninguna

Aplicación

Tras la preparación, limpiar la zona a tratar y secar bien con aire caliente. Transferir Secura Varnish gota a gota al instrumento de aplicación y aplicarlo rápidamente.

Secar durante 30 segundos con aire caliente y repetir la aplicación.

Advertencias**sobre riesgos residuales**

Deben respetarse siempre las instrucciones de procesamiento y las medidas de precaución descritas en las instrucciones de uso que acompañan al producto. Si se produce una reacción no deseada en el paciente u otros sucesos no deseados a pesar del cumplimiento de estas instrucciones, solicitamos en cualquier caso una notificación con una descripción lo más detallada posible de las circunstancias que la acompañan

Reacciones adversas

Por el momento no se conocen reacciones adversas. En algunos casos no debe descartarse una hipersensibilidad a los componentes del material. Evitar el contacto con la piel. En caso de contacto accidental, lavar inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.

En caso de que quiera comunicarnos algún efecto secundario no deseado o en caso de duda, le rogamos que nos remita una descripción lo más detallada posible de las circunstancias y síntomas.

No se conocen los riesgos en caso de sobredosis.

Riesgos durante la aplicación: ¡no se debe utilizar una llama abierta durante la aplicación! El disolvente es inflamable.

Interacciones

Se desconoce la interacción del producto con otros productos médicos, medicamentos u otras sustancias.

Almacenamiento

Volver a cerrar inmediatamente el tarro después de extraer el líquido. De lo contrario, podría producirse un cambio desfavorable en la consistencia. El producto debe almacenarse entre 0° C y 22° C.

Vida útil

No utilizar después de la fecha de caducidad.

Variantes

REF WP4099 1 x 10,0 ml líquido

Eliminación

El material no utilizado puede eliminarse con los residuos domésticos después de su endurecimiento por evaporación.

Todos los incidentes graves relacionados con el producto se comunicarán al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario o el paciente.



We know how

dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48
www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de



Willmann & Pein GmbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9228-0
Fax: +(49) 4123/9228-49
www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



H319 Provoca irritaciones oculares graves
H224 Líquido y vapores extremadamente inflamables
H336 Puede provocar somnolencia y vértigo.

Made in Germany



Istruzioni per l'uso

Gruppo di pazienti target

Bambini, adolescenti, adulti e pazienti anziani

Utenti previsti

Dentista

Composizione

Dati qualitativi:

nitrocellulosa, citrato di trietile, acetato di etile

Dati quantitativi in % G/G:

nitrocellulosa 15

Destinazione d'uso del prodotto

Vernice sigillante

Indicazioni

Secura Varnish serve a sigillare la superficie, i cementi vetroionomerici.

Controindicazioni

Non utilizzare in caso di allergia nota a uno dei componenti.

Caratteristiche del prodotto

Vernice sigillante autopolimerizzante a base di nitrocellulosa.

Precauzioni speciali

Nessuna

Modalità di applicazione

Dopo la preparazione, pulire le superfici da trattare e asciugare bene con aria calda. Trasferire Secura Varnish goccia a goccia sullo strumento di applicazione e applicare rapidamente.

Asciugare con aria calda per 30 secondi e ripetere l'applicazione.

Avvertenze rischi residui

Le istruzioni di lavorazione e le misure precauzionali descritte nelle istruzioni per l'uso accluse al prodotto devono essere sempre rispettate. Qualora si verificasse una reazione indesiderata nel paziente o insorgessero altri eventi indesiderati nonostante l'osservanza di queste istruzioni, vi preghiamo di informarci in ogni caso, descrivendo le circostanze nel modo più preciso possibile.

Effetti collaterali

Non sono attualmente noti casi di effetti collaterali. In casi individuali, l'ipersensibilità ai componenti del materiale non può essere esclusa. Evitare il contatto con la cute. In caso di contatto accidentale, lavare subito con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con molta acqua e consultare un medico. Se doveste venire a conoscenza di eventuali effetti collaterali indesiderati, anche in casi dubbi, vi preghiamo di informarci in ogni caso, descrivendo le circostanze e i sintomi che li accompagnano nel modo più preciso possibile.

I rischi in caso di sovradosaggio non sono noti.

Rischi durante l'applicazione: non utilizzare fiamme libere durante l'applicazione! Il solvente è infiammabile.

Interazioni

Non è nota un'interazione del prodotto con altri medicinali, farmaci o altre sostanze.

Conservazione

Chiudere il flacone immediatamente dopo l'uso per evitare la variazione di consistenza del liquido. Il prodotto deve essere conservato tra 0° C e 22°C.

Durata minima

Non usare dopo la data di scadenza.

Varianti

[REF]WP4099 1 x 10,0 ml di liquido

Smaltimento

Dopo l'indurimento, il materiale non utilizzato può essere conferito insieme ai rifiuti domestici.

Qualsiasi incidente verificatosi in correlazione con il prodotto deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui dimora l'utilizzatore e/o il paziente.



We know how

dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48
www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de



Willmann & Pein GmbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9228-0
Fax: +(49) 4123/9228-49
www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



Made in Germany



H319 provoca grave irritazione agli occhi
H224 liquido e vapore estremamente infiammabile
H336 può causare sonnolenza e vertigini.

01.06.2023
2023-REV-010

Uputstvo za upotrebu

Ciljna grupa pacijenata

Djeca, adolescenti, odrasli i starije osobe

Predviđeni korisnici

Zubar

Sastav

Kvalitativni podaci:

Nitroceluloza, trietilcitrati, etilacetat

Kvantitativni podaci u % G/G:

Nitroceluloza 15

Namjena proizvoda

Lak za zatvaranje

Indikacije

Secura Varnish služi za zatvaranje površina staklenoionomernih cemenata.

Kontraindikacije

Nemojte koristiti ako je poznata alergija na bilo koju komponentu.

Karakteristike proizvoda

Samostvrđnjavajući lak za zatvaranje na bazi nitroceluloze.

Posebne preventivne mjere

Nema

Primjena

Nakon pripreme površine koje se tretiraju očistiti i dobro posušiti toplim zrakom. Secura Varnish kapajući prenijeti na instrument za aplikaciju i brzo aplicirati.

30 sekundi sušiti toplim zrakom pa ponoviti aplicirati.

Upozorenja**na preostale rizike**

Neophodno je u svakom slučaju pridržavati se napomena o obradi i mjera opreza opisanih u informacijama za upotrebu proizvoda. Ako i uz pridržavanje tih napomena kod pacijenta dođe do pojave neželjene reakcije ili drugih neželjenih događaja, u svakom slučaju nas obavijestite uz što je moguće precizniji opis popratnih okolnosti.

Nuspojave

Do sada nisu poznate nuspojave. U pojedinačnim slučajevima ne može se isključiti preosjetljivost na komponente materijala. Izbjegavati kontakt s kožom. Prilikom slučajnog kontakta odmah isprati sapunom i vodom. U slučaju kontakta s očima odmah isprati s puno vode i potražiti pomoć ljekara.

Ako primijetite neželjene nuspojave - čak i u slučajevima sumnje - u svakom slučaju nas obavijestite uz što je moguće precizniji opis popratnih okolnosti i simptoma.

Nisu poznati rizici u slučaju predoziranja.

Rizici prilikom upotrebe: nema otvorenog plamena prilikom upotrebe! Rastvarač je zapaljiv.

Interakcije

Nije poznata interakcija proizvoda s drugim medicinskim proizvodima, lijekovima ili drugim supstancama.

Čuvanje

Nakon uzimanja tečnosti bočicu odmah ponovo zatvoriti, jer inače može doći do nepovoljne promjene konzistencije. Proizvod treba čuvati na temperaturi između 0 °C - 22 °C.

Rok upotrebe

Proizvod ne upotrebljavati nakon isteka datuma roka trajanja.

Varijante

[REF]WP4099 1 x 10,0 ml tečnosti

Odlaganje

Neupotrijebljeni materijal se može odložiti s kućnim otpadom nakon što se hlađenjem stvrdne.

Svi ozbiljni incidenti koji su se dogodili u vezi s proizvodom moraju se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent ima sjedište odn. prebivalište.



We know how

dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48
www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de



Willmann & Pein GmbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9228-0
Fax: +(49) 4123/9228-49
www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



Made in Germany



H319 izaziva ozbiljne iritacije očiju
H224 tečnost i para su izuzetno zapaljivi
H336 Može izazvati pospanost i omamljenost

01.06.2023
2023-REV-010

Instrucțiuni de utilizare

Grupul țintă de pacienți

Copii, adolescenți, adulți și pacienți vârstnici

Utilizatorul preconizat

Medicul stomatolog

Compoziție

Informații calitative:

nitroceluloză, citrat de trietil, acetat de etil

Informații cantitative în % G/G:

Nitroceluloză 15

Scopul prevăzut al produsului

Lac de sigilare

Indicații

Produsul Secura Varnish este utilizat pentru sigilarea suprafeței, a cimenturilor din ionomer de sticlă.

Contraindicații

A nu se utiliza dacă se cunoaște vreo alergie la vreuna dintre componente.

Caracteristicile de performanță ale produsului

Lac de sigilare auto-solidifiant pe bază de nitroceluloză..

Măsurile speciale de precauție

Nu există

Utilizare

După preparare, curățați suprafețele care urmează să fie tratate și uscați-le bine cu aer cald. Aplicați picături de Secura Varnish pe instrumentul de aplicare și aplicați rapid.

Uscați 30 de secunde cu aer cald și repetați aplicarea.

Atenționări**privind riscurile reziduale**

Instrucțiunile de prelucrare descrise în instrucțiunile de utilizare care aparțin produsului, precum și măsurile de precauție trebuie să fie respectate în orice situație. În cazul în care, în pofida respectării acestor indicații, există o reacție nedorită a pacientului sau alte evenimente nedorite, solicităm, în orice situație, să procedați la notificarea acestora cu descrierea cât mai precisă a circumstanțelor însoțitoare

Reacții adverse

Până în prezent nu se cunosc reacții adverse. În cazuri individuale, nu poate fi exclusă hipersensibilitatea la componentele substanței. A se evita contactul cu pielea. În cazul contactului accidental, spălați imediat cu apă și săpun. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și consultați un medic. Dacă observați orice fel de reacții adverse nedorite – și în caz de incertitudine – vă solicităm, în orice situație, să procedați la notificarea acestora cu descrierea cât mai precisă a circumstanțelor și a simptomelor însoțitoare.

Riscurile de supradozaj nu sunt cunoscute.

Riscuri în timpul aplicării: nu folosiți flacăra deschisă în timpul aplicării! Solventul este inflamabil.

Interacțiuni medicamentoase

Nu se cunoaște nicio interacțiune a produsului cu alte produse medicale, medicamente sau alte substanțe..

Depozitare

Închideți flaconul imediat după turnarea lichidului; în caz contrar, consistența se poate modifica nefavorabil. Produsul trebuie depozitat în intervalul de temperatură 0 °C - 22 °C.

Termen minim de valabilitate

A nu se utiliza după data de expirare.

Variante

[REF]WP4099 1 x 10,0 ml Lichid

Eliminarea ca deșeu

Materialul neutilizat poate fi eliminat după întărire împreună cu deșeurile menajere.

Toate incidentele grave care implică produsul sunt raportate producătorului și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.



We know how

dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48
www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de



Willmann & Pein GmbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9228-0
Fax: +(49) 4123/9228-49
www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



Made in Germany



H319 Provoacă iritații oculare severe
H224 Lichid și vapori extrem de inflamabili
H336 Poate provoca somnolență și amețeli.

Kullanma kılavuzu

Hedef hasta grubu

Çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaşlı hastalar

Öngörülen kullanıcılar

Diş hekimi

Bileşim

Nitel bilgiler:

Nitroselüloz, trietilsitrat, etilasetat

Kantitatif bilgiler, % G/G olarak:

Nitroselüloz 15

Ürünün amacı

Kapatma lakesi

Endikasyonlar

Secura Varnish cam iyonomer simanların yüzey sızdırmazlığı için kullanılır.

Kontraendikasyonlar

Bir bileşene karşı bilinen alerjiler varsa, kullanmayın.

Ürünün özellikleri

Nitroselüloz bazında kendinden sertleşen kapatma lakesi.

Özel önleyici tedbirler

Yoktur

Uygulama

Hazırladıktan sonra tedavi edilecek yüzeyi temizleyin ve sıcak havayla iyice kurutun. Secura Varnish'i damla şeklinde uygulama aracına aktarın ve hızlı şekilde uygulayın.

30 saniye boyunca sıcak havayla kurutun ve uygulamayı tekrarlayın.

Uyarılar**Diğer riskler**

Ürüne ait kullanım bilgilerinde tarif edilen işleme bilgilerine ve önleyici tedbirlere her durumda uyulmalıdır. Bu tavsiyelere uyulmasına rağmen, hastada istenmeyen bir reaksiyon ya da arzu edilmeyen herhangi bir başka gelişme görülürse, bizi her halükarda bilgilendirmenizi ve eşlik eden durumları olabildiğince açık bir şekilde tanımlamanızı rica ederiz.

Yan etkiler

Şimdiye kadar herhangi bir yan etkisi bilinmemektedir. Münferit durumlar da materyalin bileşenlerine karşı yüksek hassasiyet konusu göz ardı edilmemelidir. Cilt ile temastan kaçının. Yanlışlıkla temas etmesi durumunda, derhal su ve sabun ile yıkayın. Gözle temas etmesi durumunda, derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

Herhangi bir istenmeyen yan etkinin farkına varmanız halinde - emin olmadığınız durumlarda bile - bizi her halükarda bilgilendirmenizi, eşlik eden durumları ve belirtileri olabildiğince açık bir şekilde tanımlamanızı rica ederiz.

Aşırı doz riskleri bilinmemektedir.

Uygulama sırasındaki riskler: Uygulama sırasında açık alev kullanılmamalıdır! Çözücü yanıcıdır.

Etkileşimler

Ürünün diğer tıbbi ürünlerle, ilaçlarla veya diğer maddelerle etkileşimi bilinmemektedir.

Saklama

İçinden sıvıyı aldıktan sonra şişeyi hemen tekrar kapatın; aksi takdirde uygun olmayan bir kıvam değişikliği meydana gelebilir. Ürün, 0°C - 22°C sıcaklık aralığında depolanmalıdır.

Son kullanma tarihi

Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.

Seçenekler

[REF] WP4099 1 x 10,0 ml sıvı

Bertaraf

Kullanılmayan materyal buharlama sonucu sertleştikten sonra evsel atıklarla bertaraf edilebilir.

Ürünle ilgili meydana gelen herhangi bir ciddi olay üreticiye ve kullanıcı ve/veya hastanın yerleşik olduğu üye devletin yetkili makamına bildirilecektir.



We know how

dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48
www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de



Willmann & Pein GmbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9228-0
Fax: +(49) 4123/9228-49
www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



Made in Germany



H319 - ciddi göz tahrişlerine neden olur
H224 - sıvı ve buhar şiddetli tutuşabilir
H336 - uykuya ve uyuşukluğa neden olabilir.