DE EN FR ES IT NL DA NO SV FI PT CS PL

P-Cem® Tuben

Gebrauchsanweisung

Patientenzielgruppe
Alle, für die zur Behandlung P-Cem benötigt wird, außer Personen, die allergisch auf die Inhaltsstoffe, hier einer Kolophonium, reagieren.

vorgesehener Anwender
Zahnarzt

Zusammensetzung
Wesentliche Bestandteile:
Harzsäure und Metalloxide

Qualitative Angaben:
Paraffin, Oleum Arachidis, Calciumhydroxid, Magnesiumoxid, Hydroxylapatit, Zinkoxid, Ethanol (Spuren), Fettsäure aus Kokosnuss, Kolophonium, Siliciumdioxid.

Quantitative Angaben:
Calciumhydroxid 2%, Kolophonium 45 %, Fettsäure 25%, Zinkoxid 10 %.

Zweckbestimmung des Produkts
P-Cem ist ein leicht zu handhabender, eugenolfreier Zement, der die Aushärtung von Füllungs- und Befestigungsmaterialien auf Kunststoffbasis nicht hemmt.
Bei Allergien gegen Eugenol ist P-Cem indiziert.
P-Cem enthält Calciumhydroxid und Hydroxylapatit zum Schutz der Zähne und zur Zahnmetallung.

Indikationen
P-Cem ist ein temporärer Haftzement für Kronen und Brücken.

Kontraindikationen
Das Material enthält Kolophonium.
Bei Patienten mit einer Allergie gegen Kolophonium, Erdnuss-Öl oder andere in dem Produkt enthaltene Stoffe, nicht verwenden.

Leistungsmerkmale des Produkts
Das Produkt härtet nach dem Anmischen aus.

Anwendung
Art der Anwendung:
Die Verarbeitung von P-Cem erfolgt bei Raumtemperatur. Längere Verarbeitungszeiten ergeben sich bei heißen Temperaturen (gekühlte Glasplatte). Das Mischungsverhältnis der Basis- (braun) und Katalysatorpaste (weiß) ist 2 zu 1 hinsichtlich des Volumens (= 1 zu 1 Gewichtsteilen). Deshalb soll der ausgedrückte Strang der Basispaste doppelt so lang wie der Strang der Katalysatorpaste sein. Beide Pasten auf einen Anmischblock von nicht absorbierendem Material oder auf eine Glasplatte auftragen. Die Paste während ungefähr 30 Sekunden mischen bis eine homogene Masse entsteht. Eine dünne Schicht auf die innenseite der temporären Krone oder Brücke oder nasse Stumpfpräparation auftragen. Nie auf trockenen Stümpfen anwenden, diese immer erst anfeuchten. P-Cem lässt sich während 1 bis 2 Minuten verarbeiten und härtet in 3 bis 6 Minuten im Mund aus.
Ca. 3 bis 5 Minuten nach der Aushärtung Überschüssiges Material entfernen.

Zusätzliche Hinweise:
Weiches Material und verlängerte Verarbeitungszeiten erzielt man durch Zugabe von etwas mehr P-Cem-Basispaste (braun) oder einer kleinen Menge Vaseline. Zusätzlich erleichtert Feuchtigkeit (feuchte Stümpfe) später die Entfernbarkeit. Härteres und schneller abbindendes Material erzielt man durch Zugabe von etwas mehr P-Cem-Katalysatorpaste (weiß) oder durch Zumischen von Zinkoxid. Ein solch härteres Material ist besser für mehrgliedrige Brücken oder Brücken sowie provisorische Langzeitverschlüsse (maximal 1 Monat) geeignet. Reste von P-Cem lassen sich leicht aus Kronen entfernen, indem man diesen mit Kältespray behandelt.

Verarbeitungshinweise:
Die in der zum Produkt gehörenden Gebrauchsanweisung beschriebenen Verarbeitungshinweise sowie Vorsichtsmaßnahmen sind in jedem Fall zu beachten. Sollte es trotz Einhaltung dieser Hinweise zu einer unerwünschten Reaktion beim Patienten kommen oder sonstige unerwünschte Vorkommnisse eintreten, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter möglichst genauer Beschreibung derBegleitumstände.

Warnhinweise/Restrisiken
Das Produkt enthält Kolophonium.
Personen die eine Allergie gegen Kolophonium haben, sollten nicht mit dem Produkt in Kontakt kommen.

Der Kontakt von angemischtem Zement mit Haut oder Schleimhaut ist zu vermeiden. Falls es doch zu einem Kontakt kommt, ist das Material mit alkoholgetränkten Wattebäuschchen zu entfernen und mit viel Wasser nachzuspülen. Bei Augenkontakt ist mit viel Wasser bei geöffnetem Lidspalt zu spülen und ein Augenarzt zu konsultieren.

Risiken/Nebenwirkungen
Risiken einer Überdosierung sind nicht bekannt.
Unerwünschte Nebenwirkungen sind nicht bekannt.

Wechselwirkungen
Eine Wechselwirkung des Produktes und seiner Metabolite mit anderen Medizinprodukten, Arzneimitteln oder sonstigen Stoffen ist nicht bekannt.

Lagerung
P-Cem sollte bei Raumtemperatur gelagert werden.
Tuben nach Gebrauch gut verschließen. Verschlüsse nicht verlauschen.

Mindesthaltbarkeit
P-Cem nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Varianten
REF WP4010 25 g Basis-Paste in Tube
25 g Katalysator-Paste in Tube

Entsorgung
Nicht zugehörtertes Material sollte dem Sondermüll zugeführt werden.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Instructions for use

Patient target group
Any patient for whom P-Cem is required for treatment, except people who are allergic to the ingredients, here especially rosin.

Intended user
Dentist

Composition
Essential components: Resin acid and metal oxides

Qualitative data:
Paraffin, peanut oil, calcium hydroxide, magnesium oxide, hydroxyapatite, zinc oxide, ethanol (traces), fatty acid from coconut, rosin, silicon dioxide.

Quantitative data:
Calcium hydroxide 2%, rosin 45%, fatty acid 25%, zinc oxide 10%.

Intended purpose of the product
P-Cem is an easy-to-handle, eugenol-free cement that does not inhibit the curing of resin-based filling and luting materials.
P-Cem is indicated for allergies to eugenol.
P-Cem contains calcium hydroxide and hydroxyapatite to protect the teeth and dental-metal-fabrication.

Indications
P-Cem is a temporary bonding cement for crowns and brides.

Contraindications
The material contains rosin. Do not use in patients with an allergy to rosin, peanut oil or other substances contained in the product.

Performance characteristics of the product
The product cures after mixing.

Application
Type of application:
P-Cem is processed at room temperature. Longer processing times result at low temperatures (cooled glass plate). The mixing ratio of the base (brown) and catalyst paste (white) is 2 to 1 in terms of volume (= 1 to 1 weight ratio). Therefore, the expressed strand of the base paste should be twice as long as the strand ot the catalyst paste. Apply both pastes to a mixing block of non absorbent material or a glass plate. Mix the paste for about 30 seconds until a homogeneous mass is obtained. Apply a thin layer to the inside of the temporary crown or bridge or wet die preparation. Never use on dry stumps, always moisten them first. P-Cem can be used for 1 to 2 minutes and cures in the mouth in 3 to 6 minutes.
Remove excess material approx. 3 to 5 minutes after curing.

Additional notes:
Softer material and longer working times can be achieved by adding a little more P-Cem base paste (brown) or a small amount of Vaseline. In addition, moisture (damp stumps) makes it easier to remove later. Harder and faster setting material can be achieved by adding a little more P-Cem catalyst paste (white) or by mixing in zinc oxide. Such a harder material is better suited for multi- and large-surface cavities as well as temporary long-term closures (maximum 1 month). Residues of P-Cem can easily be removed from crowns by treating them with a cold spray.

Processing instructions:
The processing instructions and precautionary measures described in the instructions for use belonging to the product must be observed in any case. If, despite adherence to these instructions, an adverse reaction occurs in the patient or other adverse events occur, we request that you inform us in any case.

Notice d'utilisation

Groupe cible de patients
Tous ceux pour qui P-Cem est nécessaire au traitement, à l'exception des personnes allergiques aux ingrédients, ici surtout la colophane.

Utilisateur prévu
Dentiste

Composition
Composants clés : Acide résinique et oxydes métalliques

Données qualitatives :
Paraffine, oleum arachidis, hydroxyde de calcium, oxyde de magnésium, hydroxyapatite, oxyde de zinc, éthanol (traces), acide gras de noix de coco, colophane, dioxyde de silicium.

Données quantitatives :
Hydroxyde de calcium 2 %, colophane 45 %, acide gras 25 %, oxyde de zinc 10 %.

Utilisation conforme du produit
P-Cem est un ciment sans eugénol, facile à manipuler, qui n'inhibe pas la polymérisation des restaurations et des matériaux de scellement à base de résine.
P-Cem est indiqué pour les allergies à l'eugénol.
P-Cem contient de l'hydroxyde de calcium et de l'hydroxyapatite pour la protection des dents et leur conservation.

Indications
P-Cem est un ciment de liaison temporal pour les couronnes et les bridges.

Contre-indications
Le matériau contient de la colophane. Ne pas utiliser chez les patients présentant une allergie à la colophane, à l'huile d'arachide ou à d'autres substances contenues dans le produit.

Caractéristiques de rendiment du produit
Le produit se endurece después de la mezcla.

Application
Mode de application:
P-Cem s'emploie à température ambiente. Les temps de prise sont plus longs à basses températures (placa de vidrio refrigerada). La relación de mezcla entre la pasta de base y la pasta catalizadora (blanca) es de 2 a 1 en términos de volumen (= relación de 1 a 1 en peso). Por tanto, la tira extruida de la pasta base debe ser dos veces más larga que la hebra de la pasta catalizadora. Aplique ambas pastas en un bloc de mezclas de material no absorbente o en una placa de vidrio. Mezcle la pasta durante unos 30 segundos hasta obtener una masa homogénea. Aplicar una fina capa en el interior de la corona o puente provisional o en préparation de la cavidad húmeda. No utilizar nunca en tocones secos, humedecerlos siempre primero. P-Cem puede utilizarse durante 1 o 2 minutos y se endurece en 3 o 6 minutos en la boca.
Retirar el exceso de material unos 3 a 5 minutos después del curado.

Notas adicionales:
Se puede conseguir un material más blando y tiempos de trabajo más largos añadiendo un poco más de pasta base P-Cem (marrón) o una pequeña cantidad de vaselina. Además, la humidité (posibles humedades) facilita posteriormente la eliminación. Se puede conseguir un material más duro y de fraguado más rápido añadiendo un poco más de pasta catalizadora P-Cem (blanca) o añadiendo óxido de zinc. Este material más duro es más adecuado para cavidades plus dur est mieux adapté à la cavités à surfaces multiples et importantes ainsi qu'aux fermetures temporaires de longue durée (1 mois maximum). Les résidus de P-Cem peuvent être facilement éliminés des couronnes en les traitant avec un spray froid.

Instructions de traitement :
Les instructions de traitement et les mesures de précaution décrites dans le mode d'emploi appartenant au produit doivent être respectées dans tous les cas. Si, malgré le respect de ces instructions, une réaction indésirable se produit chez le patient ou en cas d'autres évènements indésirables, nous demandons dans tous les cas une notification avec une description aussi détaillée que possible des circonstances qui l'accompagnent.

Avertissements/risques résiduels
Le produit contient de la colophane. Les personnes allergiques à la colophane ne doivent pas entrer en contact avec le produit.

Éviter tout contact du ciment mélangé avec la peau ou les muqueuses. En cas de contact, enlever la matière avec des cotons-tiges imbibés d'alcool et rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau en gardant les paupières ouvertes et consulter un ophtalmologiste.

Risques/effets secondaires
Les risques de surdosage ne sont pas connus.
Des effets secondaires indésirables ne sont pas connus.

Interactions
Une interaction du produit et de ses métabolites avec d'autres dispositifs médicaux, médicaments ou autres substances n'est pas connue.

Stockage
P-Cem doit être conservé à température ambiante.
Fermez hermétiquement les tubes après utilisation.
Ne pas interchanger les bouchons.

Durée de conservation
Ne pas utiliser P-Cem après la date de péremption.

Variantes
REF WP4010 25 g de pâte de base en tube
25 g de pâte catalytique en tube

Élimination
Les matériaux non polymérisés doivent être éliminés comme des déchets dangereux.

Tous les incidents graves liés au produit doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Información para el usuario

Grupo objetivo de pacientes
Todos los que necesitan P-Cem para el tratamiento, excepto las personas alérgicas a los ingredientes, especialmente la colofonia.

Usuarios previstos
Dentista

Composición
Componentes clave: Ácido resinoso y óxidos metálicos

Datos cualitativos:
Parafina, oleum arachidis, hidróxido de calcio, óxido de magnesio, hidroxiapatita, óxido de zinc, ethanol (trazas), ácido graso de coco, colofonia, dióxido de silicio.

Datos cuantitativos:
Hidróxido de calcio 2 %, colofonia 45 %, ácido graso 25 %, óxido de zinc 10 %.

Finalidad del producto
P-Cem es un cemento sin eugenol, fácil de manipular, que no inhibe el curado de los materiales de restauración y cementación a base de resina.
P-Cem está indicado para las alergias al eugenol. P-Cem contiene hidróxido de calcio e hidroxiapatita para la protección de los dientes y su conservación.

Indicaciones
P-Cem es un cemento adesivo temporal para coronas y puentes.

Contraindicaciones
Este material contiene colofonia. No utilizar en pacientes con alergia a la colofonia, al aceite de cacahuete o a otras sustancias contenidas en el producto.

Características de rendimiento del producto
El producto se endurece después de la mezcla.

Aplicación
Modo de aplicación:
El P-Cem se procesa a temperatura ambiente. Los tiempos de procesamiento son más largos a bajas temperaturas (placa de vidrio refrigerada). La relación de mezcla entre la pasta base y la pasta catalizadora (blanca) es de 2 a 1 en términos de volumen (= relación de 1 a 1 en peso). Por tanto, la tira extruida de la pasta base debe ser dos veces más larga que la hebra de la pasta catalizadora. Aplique ambas pastas en un bloc de mezclas de material no absorbente o en una placa de vidrio. Mezclar bien las dos pastas durante unos 30 segundos hasta obtener una masa homogénea. Aplicar una fina capa en el interior de la corona o puente provisional o en préparation de la cavidad húmeda. No utilizar nunca en tocones secos, humedecerlos siempre primero. P-Cem puede utilizarse durante 1 o 2 minutos y se endurece en 3 o 6 minutos en la boca.
Retirar el exceso de material unos 3 a 5 minutos después del curado.

Notas adicionales:
Deben respetarse en todo caso las instrucciones de procesamiento y las medidas de precaución descritas en las instrucciones de uso pertenecientes al producto. Si se produce una reacción no deseada en el paciente u otros sucesos no deseados a pesar del cumplimiento de estas instrucciones, solicitamos en cualquier caso una notificación con una descripción lo más detallada posible de las circunstancias que la acompañan.

Advertencias/riesgos residuales
El producto contiene colofonia. Las personas alérgicas a la colofonia no deben entrar en contacto con el producto.

Evitar el contacto del cemento mezclado con la piel o las mucosas. Si se produce el contacto, retirar el material con bastoncillos de algodón empapados en alcohol y aclarar con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, aclarar con abundante agua con los párpados abiertos y consultar a un oftalmólogo.

Riesgos/efectos secundarios
No se conocen riesgos de sobredosis. No se conocen efectos segundarios.

Interacciones
Se desconoce la interacción del producto y los metabolitos con otros productos médicos, medicamentos u otras sustancias.

Almacenamiento
El P-Cem debe almacenarse a temperatura ambiente.
Cerrar bien los tubos después de usarlos.
No intercambiar los cierres.

Vida útil
No utilizar P-Cem después de la fecha de caducidad.

Variantes
REF WP4010 25 g de pasta base en tubo
25 g de pasta catalizadora en tubo

Eliminación
El material no curado debe eliminarse como residuo peligroso.

Todos los incidentes graves relacionados con el producto se deben comunicar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario o el paciente.

Istruzioni per l'uso

Gruppo di pazienti target
Tutti coloro per i quali il P-Cem è necessario per il trattamento, tranne le persone allergiche agli ingredienti, in questo caso soprattutto la colofonia.

Utilizzatore previsto
Dentista

Composizione
Componenti essenziali: acido di resina e ossidi di metallo

Informazioni qualitative:
Paraffina, oleum arachidis, idrossido di calcio, ossido di magnesio, idrossiapatite, ossido di zinco, etanolo (tracce), acido grasso di cocco, colofonia, biossido di silicio.

Informazioni quantitative:
Idrossido di calcio 2%, colofonia 45%, acidi grassi 25%, ossido di zinco 10%.

Destinazione d'uso del prodotto
P-Cem è un cemento di facile uso privo di eugenolo che non inibisce l'indurimento dei materiali di riempimento e cementazione a base di resina.
P-Cem è indicato in caso di allergie note all'eugenolo. P-Cem contiene idrossido di calcio e idrossiapatite per la protezione dei denti e la conservazione dei denti.

Indicazioni
P-Cem è un cemento adesivo temporaneo per corone e ponti.

Controindicazioni
Il materiale contiene colofonia. Non utilizar en pacientes con alergia a la colofonia, al aceite de cacahuete o a otras sustancias contenidas en el producto.

Caratteristiche del prodotto
Il prodotto si indurisce dopo la miscelazione.

Modalità d'uso
Modalità di applicazione:
P-Cem viene lavorato a temperatura ambiente, se base temperature (piastra di vetro raffreddata) comportano tempi di lavorazione più lunghi. La proporzione di miscelazione della pasta di base (marrone) e catalizzatrice (bianca) è di 2 a 1 in termini di volume (= rapporto di peso 1 a 1). Pertanto, il filo estruso della pasta base dovrebbe essere due volte più lungo del filo della pasta catalizzatrice. Applicare entrambe le paste su un blocco di miscelazione di materiale non assorbente o su una piastra di vetro. Mescolare la pasta per circa 30 secondi fino a ottenere una massa omogenea. Applicare uno strato sottile all'interno della corona provvisoria o ponte o preparazione o del moncone bagnato. Non usare mai su monconi asciutti, inumidirli sempre prima. P-Cem può essere usato per 1 o 2 minuti e si indurisce in bocca nei giro di 3-6 minuti.
Rimuovere il materiale in eccesso circa 3-5 minuti dopo l'indurimento.

Note aggiuntive:
materiale più morbido e tempi di lavoro più lunghi possono essere ottenuti aggiungendo un po' più di pasta base P-Cem (marrone) o una piccola quantità di vaselina. Inoltre, l'umidità (monconi umidi) facilita la rimozione in un secondo momento. Un materiale più duro e a presa più rapida può essere ottenuto aggiungendo un po' più di pasta catalitica P-Cem (bianca) o aggiungendo ossido di zinco. Un materiale più duro è più adatto per cavità a superficie multipla e larga e per chiusure a lungo termine (massimo 1 mese). I residui di P-Cem possono essere facilmente rimossi dalle corone, trattandoli brevemente con del ghiaccio spray.

Istruzioni per il trattamento:
Le istruzioni di lavorazione e le misure precauzionali descritte nelle istruzioni per l'uso appartenenti al prodotto devono essere osservate in ogni caso. Qualora si verificasse una reazione indesiderata nel paziente o insorgessero altri eventi indesiderati nonostante l'osservanza di queste istruzioni, vi preghiamo di informarci in ogni caso, descrivendo le circostanze nel modo più preciso possibile.

Avvertenze/rischi residui
Il prodotto contiene colofonia. Le persone con un'allergia nota alla colofonia non devono entrare a contatto con il prodotto.

Evitare il contatto del cemento miscelato con la cute o le mucose. In caso di contatto, rimuovere il materiale con batuffoli di cotone imbevuti di alcol e sciacquare con abbondante acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua tenendo le palpebre aperte e consultare un oculista.

Rischi/effetti collaterali
I rischi di sovradosaggio non sono noti. Non sono noti effetti collaterali indesiderati.

Interazioni
Non è nota un'interazione del prodotto e dei suoi metaboliti con altri medicinali, farmaci o altre sostanze.

Conservazione
P-Cem deve essere conservato a temperatura ambiente.
Chiudere bene i tubetti dopo l'uso.
Non scambiare i tappi.

Durata minima
Non usare P-Cem dopo la data di scadenza.

Varianti
REF WP4010 Pasta base in tubetto 25 g
Pasta catalitica in tubetto 25 g

Smaltimento
Il materiale non polimerizzato deve essere smaltito come rifiuto speciale.

Qualsiasi incidente verificatosi in correlazione con il prodotto deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui dimora l'utilizzatore e/o il paziente.

Gebruiksaanwijzing

Patiëntendoelgroep
Iedereen voor wie P-Cem nodig is voor behandeling, behalve mensen die allergisch zijn voor de bestanddelen, hier vooral colofonium.

Beoogde gebruiker
Tandarts

Samenstelling
Belangrijkste bestanddelen: harszuur en metaaloxiden

Kwalitatieve gegevens:
Paraffine, oleum arachidis, calciumhydroxide, magnesiumoxide, hydroxyapatiet, zinkoxide, ethanol (sporen), vetzuur uit kokosnoot, colofonium, siliciumdioxide.

Kwantitatieve gegevens:
Calciumhydroxide 2%, colofonium 45%, vetzuur 25%, zinkoxide 10%.

Doel van het product
P-Cem is een gemakkelijk hanteerbaar, eugenolvrij cement dat de uitharding van vul- en bevestigingsmaterialen op basis van kunststof niet belemmert.
P-Cem is geïndiceerd bij allergie voor eugenol.
P-Cem bevat calciumhydroxide en hydroxyapatiet voor de bescherming en het behoud van de tanden.

Indicaties
P-Cem is een tijdelijk hechtingscement voor kronen en bruggen.

Contra-indicaties
Het materiaal bevat colofonium. Niet gebruiken bij patiënten met een allergie voor colofonium, pindaolie of andere stoffen in het product.
Prestatiekenmerken van het product
Het product verhardt na het mengen.

Toepassing
Wijze van toepassing:
P-Cem wordt verwerkt bij kamertemperatuur. Langere verwerkingstijden ontstaan bij lage temperaturen (gekoelde glasplaat). De mengverhouding tussen de basispasta (bruin) en de katalysatorpasta (wit) is 2 op 1 qua volume (= 1 op 1 qua gewichtsverhouding). Daarom moet de uitgeduwde streng van de basispasta tweemaal zo lang zijn als de streng van de katalysatorpasta. Breng beide pasta's aan op een mengblok van niet-absorberend materiaal of een glasplaat. Meng de pasta gedurende ongeveer 30 seconden tot een homogene massa ontstaat. Breng een dun laagje aan op de binnenkant van de tijdelijke kroon of brug of op de natte tandenpreparatie. Gebruik het product nooit op droge stompen, bevochtig deze altijd eerst. P-Cem kan gedurende 1 tot 2 minuten verwerkt en hardt in 3 tot 6 minuten uit in de mond.
Verwijder overtollig materiaal ca. 3 tot 5 minuten na uitharding.

Extra aanwijzingen:
Zachter materiaal en langere verwerkingstijden kunnen worden verkregen door een beetje meer P-Cem-basispasta (bruin) of een kleine hoeveelheid vaseline toe te voegen. Bovendien vergemakkelijkt vocht (vochtige stompen) later de verwijderbaarheid. Harder en sneller hardend materiaal kan worden verkregen door een beetje meer P-Cem-katalysatorpasta (wit) toe te voegen of door zinkoxide bij te mengen. Een dergelijk harder materiaal is beter geschikt voor meervlakkige en grotere caviteiten en voor provisorische langdurige afsluitingen (maximaal 1 maand). Resten van P-Cem kunnen gemakkelijk van kronen worden verwijderd door ze met een koude spray te behandelen.

Verwerkingsvoorschriften:
De verwerkingsvoorschriften en voorzorgsmaatregelen, beschreven in de bij het product

overholdelse af disse instruktioner, beder vi dig om at underrette os under alle omstændigheder, og beskrive de ledsagende omstændigheder så præcist som muligt.

Advarsler/restrisiko
Produktet indeholder kolofonium. Personer som er allergiske mot kolofonium skal ikke komme i kontakt med produktet.

Den blandede cementen skal ikke komme i kontakt med huden eller slimhinnen. Hvis det kommer i kontakt, fjerner du materialet med bomullsdott dyrket i alkohol og skyller med rikelig med vann. I tilfelle kontakt med øynene, må du skylle med rikelig med vann med øyelokket åpent og konsultere en øyelege.

Risikoer/bivirkninger
Det er ingen kjente risikoer for overdosering. Ønskede bivirkninger er ikke kjent.

Interaksjoner
Interaksjoner mellom produktet og dets metabolitter med andre medisinske produkter, legemidler eller andre stoffer er ikke kjent.

Lagring
P-Cem skal lagres ved romtemperatur.
Tuben må lukkes godt etter bruk.
Ikke bland lukkene.

Minste holdbarhet
P-Cem må ikke brukes etter utløpsdatoen.

Varianter
REF WP4010 25 g basispasta i tube
25 g katalysatorpasta i tube

Kassering
Ikke-herdet material skal kastes som spesialavfall.

Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med produktet må rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten har sitt bosted.

Bruksanvisning

Patientmålgrupp
Alla som trenger P-Cem till behandlingen, med undtag av personer som får en allergisk reaktion på ingredienserse, speselt kolofonium.

Tiltenkt bruker
Tandläge

Sammensetning
Viktige komponenter: Harpikssyre og metalloksider

Kvalitative opplysninger:
Paraffin, oleum arakidis, kalsiumhydroksid, magnesiumoksid, hydroksyapatitt, sinkoksid, ethanol (spor), fettsyrer fra kokosnøtt, kolofonium, silisiumdioksid.

Kvantitative angiveiser:
Kalsiumhydroksid 2%, kolofonium 45%, fedtsyrer 25%, sinkoksid 10%.

Produktets tiltenkte bruk
P-Cem er en brukervennlig, eugenolfri cement, der ikke hemmer herdningen av fyll- og festematerialer basert på plast.
P-Cem er indisert for allergi mot eugenol. P-Cem inneholder calciumhydroksid og hydroksyapatitt for å beskytte og bevaring af tannlege.

Indikasjoner
P-Cem er en midlertidig klebende sement for kroner og bruer.

Kontraindikasjoner
Materialet inneholder kolofonium. Må ikke brukes på pasienter som er allergiske overfor kolofonium, jordnøttolje eller andre stoffer i produktet.

Produktets egenskaper
Produktet herder etter blanding.

Anvendelse
Form for anvendelse:
P-Cem forarbejdes ved stuetemperatur. Lave temperaturer (kølet glasplade) bevirker længere herdetider. Blandingsforholdet mellem basis- (brun) og katalysatorpasten (hvid) er 2 til 1 rør del gjelder volum (= 1 til 1 vægtforhold). Derfor bør den ekstruderte streng av basispasten være dobbelt så lang som strengen til katalysatorpasten. Påfør begge pastaer på en blandingsblokk av ikke-absorberende materiale eller en glasplate. Bland pastaen i ca. 30 sekunder til en homogen masse oppstår. Påfør et tynt lag på innsiden av den midlertidige kronen eller broen eller det våte preparat. Bruk aldri på tørre stubber, fukt dem alltid først. P-Cem kan behandles i 1 til 2 minutter og stivner i munnen på 3 til 6 minutter.
Fjern overflødig materiale ca. 3 til 5 minutter etter herding.

Ytterligere informasjon:
Mykere materiale og lengre behandlingstider kan oppnås ved å tilsette litt mer P-Cem-basispasta (brun) eller en liten mengde vaselin. Dessuten underlättar fukt (fuktiga stumpar) den senare borttagningen. Hårdare och snabbare härdande material kan uppnås genom att tillsätta lite mer P-Cem-katalysatorpasta (vit) eller genom blandning av zinkoxid. Ett sådant hårdare material är böttre lämpat för hårrum i flera områden och stora ytor samt för provisoriska långvariga förslutningar (högst 1 månad). Rester av P-Cem kan enkelt avlägsnas från kronor genom behandling dem med kyls pray.

Bearbetningsinformation:
Bearbetningsinformationen och försiktighetsåtgärderna som beskrivs i produktens bruksanvisning måste under alla omständigheter iakttas. Om en oönskad reaktion skulle uppstå hos patienten trots att dessa instruktioner iakttas, ber vi dig att du meddelar oss detta och därvid

lämnar en så exakt beskrivning som möjligt av sammanhanget.

Varningsinformation/kvarstående risker
Produkten innehåller kolofonium. Personer som är allergiska mot kolofonium bör inte komma i kontakt med produkten.

Det blandade cementet får inte komma i kontakt med huden eller slemhinnan. Om trots allt en kontakt uppstår, ska materialet avlägsnas med bomullstussar som dränkts i alkohol. Skölj därefter med mycket vatten. Vid kontakt med ögonen, skölj med mycket vatten med ögonlocket öppet och uppsök en ögonläkare.

Risker/biverkningar
Det finns inga kända risker vid överdosering. Det finns inga kända oönskade biverkningar.

Interaktioner
En interaktion mellan produkten och dess metabolitter med andra medicinprodukter, läkemedel eller andra ämnen är inte känd.

Förvaring
P-Cem ska förvaras vid rumstemperatur.
Stäng tubernas ordentligt efter användning.
Förväxla inte förslutningar.

Minsta hållbarhetstid
P-Cem får inte användas efter utgångsdatumet.

Varianter
REF WP4010 25 g bospasta i en tub
25 g katalysatorpasta i en tub

Avfallshantering
Ohärdat material måste lämnas till avfallshantering som farligt avfall.

Alla allvarliga incidenter som har inträffat i samband med produkten måste rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

Käyttöohje

Potilaskohderyhmä
Kaikille, joiden hoidossa tarvitaan P-Cemiä, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka ovat allergisia ainesosille, etenkin kolofoniille.

Suunniteltu käyttäjä
Hammaslääkäri

Koostumus
Keskeiset komponentit: Hartsihappo ja metallioksidit

Kvalitatiiviset tiedot:
Parafiini, oleum arachidis, kalsiumhydroksidi, magnesiumoksidi, hydroksiapatiitti, sinkkioksidi, etanoli (jäämiä), kookosrasvahappo, kolofoni, piidioksidi.

Kvantitatiiviset tiedot:
Kalsiumhydroksidi 2 %, kolofoni 45 %, rasvahappo 25 %, sinkkioksidi 10 %.

Tuotteen tarkoituksen määritys
P-Cem on helppokäyttöinen, eugenolivapaa sementti, joka ei estä muovipohjaisten täyte- ja kiinnitysmateriaalien kovettumista.
P-Cemiä voidaan käyttää eugenoliallergioiden yhteydessä. P-Cem sisältää kalsiumhydroksidia ja hydroksiapatiittia hampaiden suojaamiseksi ja niiden säilyttämiseksi.

Indikaatiot
P-Cem on väliaikainen sidosmentti kruunuille ja siltojen väliaikainen sidosementti.

Kontraindikaatiot
Materiaali sisältää kolofoniia. Ei saa käyttää potilaille, jotka ovat allergisia kolofoniille, maapähkinäöljylle tai muille tuotteen sisältämille aineille.

Tuotteen ominaisuudet
Tuote kovettuu sekoittamisen jälkeen.

Käyttö
Käyttötapa:
P-Cemiä käsitellään huoneenlämmössä. Käsittelyaikaa voidaan pidentää matalissa lämpötiloissa (jäähdytetty lasilevy). Pohja- (ruskea) ja katalysaattorisementtien (valkoinen) sekoitussuhde on 2:n tilavuuden suhteen (= painosuhde 1:1). Tämän vuoksi ekstrudoidun purosteen säikeen on oltava kaksi kertaa pidempi kuin katalysaattorimassan säikeen. Levitä molemmat tahnat ei-imukykyisestä materiaalista valmistetulle sekoitusalustalle tai lasilevylle. Alusta massa noin 30 sekunnin ajan, kunnes saat homogeenisen massan. Levitä ohut kerros väliaikaisen kruunun tai sillan sisäpuolelle tai märälle preparoidulle hampaalle. Älä koskaan käytä kuivin muotteihin, vaan kostuta ne aina ensin. P-Cemiä voidaan työstää 1–2 minuuttia ja se kovettuu suussa 3–6 minuutissa.
Poista ylimääräinen materiaali noin 3-5 minuutin kuluttua kovettumisesta.

Lisäohjeita:
Pehmeämpi materiaali ja pidemmät työstöajat voidaan saavuttaa lisäämällä hieman enemmän P-Cem-perustahnaa (ruskeaa) tai pieni määrä vaseliinia. Lisäksi kosteus (kostut muotit) helpottaa myöhemmin irrottettavuutta. Kovempaa ja nopeammin sitoutuvaa materiaali saadaan lisäämällä hieman enemmän P-Cem-katalysaattoritahnaa (valkoinen) tai lisäämällä sinkkioksidia. Tällaista kovempi materiaali soveltuu paremmin monti- ja suuripintaisiin reikiin sekä tilapäisiin kiinnityksiin pidikkeisiin (enintään 1 kuukausi).
P-Cem-jäämät voidaan helposti poistaa kruunuista käsittelemällä ne kylmäspraylla.

Käsittelyohjeet:
Tuotteeseen kuuluvassa käyttöohjeessa kuvattuja käsittelyohjeita ja varotoimenpiteitä on ehdottomasti noudatettava. Jos potilaalla ilmenee ei-toivottuja oireita näiden ohjeiden noudattamisesta huolimatta, pyydämme teitä ilmoittamaan meille asiasta joka tapauksessa ja kuvaamaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti asiaan liittyvät seikat.

Varoitukset/Jäännösriskit
Tuote sisältää kolofoniia. Kolofoniille allergiset henkilöt eivät saa joutua kosketuksiin tuotteen kanssa.

Vältä sekoitetun sementin joutumista iholle tai limakalvoille. Jos materiaali kuitenkin joutuu kosketukseen iho tai limakalvon kanssa, poista se alkoholiin kastetulla pumpulipukalla ja huuhtele runsaalla vedellä. Silmäkosketuksen sattuessa huuhtele runsaalla vedellä silmäluomien ollessa auki ja ota yhteys silmälääkäriin.

Riskit/Sivuvaikutukset
Yliannostuksen riskit eivät ole tiedossa.
Ei-toivottuja sivuvaikutuksia ei ole tiedossa.

Yhteisvaikutukset
Tuotteen ja sen metaboliittien yhteisvaikutuksia muiden lääketieteellisten tuotteiden, lääkkeiden tai muiden aineiden kanssa ei ole tiedossa.

Säilytys
P-Cem tulee säilyttää huoneilämpötilassa. Sulje tuubit huolellisesti käytön jälkeen. Älä vaihda niiden korkkeja.

Säilyvyys
Älä käytä P-Cemiä viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Versiot
REF WP4010 25 g pohjatahnaa tuubissa
25 g katalysaattoritahnaa tuubissa

Hävittäminen
Ei-kovettunut materiaali tulee hävittää erikoisjätteenä.

Kaikki tuotteeseen liittyvät vakavat tapaukset on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion asianomaiselle virastolle, jossa käyttäjä ja/tai potilas on kirjoilla.

Instruções de utilização

Grupo-alvo de pacientes
Todos a quem tenha sido prescrito P-Cem para o tratamento, exceto pessoas que com alergia aos ingredientes, especialmente à resina.

Utilizador previsto
Dentista

Composição
Principais componentes: Ácido resínico e e óxidos metálicos

Informações qualitativas:
Parafina, óleo de Arachis, hidróxido de cálcio, óxido de magnésio, hidroxiapatita, óxido de zinco, etanol (vestígios), ácido gordo de coco, resina, dióxido de silício.

Informações quantitativas:
Hidróxido de cálcio 2%, resina 45%, ácido gordo 25%, óxido de zinco 10%.

Finalidade do produto
O P-Cem é um cimento dentário sem eugenol, fácil de manusear, que não inibe a presa e adesão de materiais de enchimento e fixação à base de resina.
O P-Cem é indicado, em caso de alergia ao eugenol. P-Cem contém hidróxido de cálcio e hidroxiapatite para a proteção dos dentes e remoção da restauração temporária.

Indicações
P-Cem é um cimento dentário adesivo provisório para coroas e pontes.

Contraindicações
O material contém resina. Em doentes com alergia à resina, óleo de amendoim ou outras substâncias contidas no produto, não se aplicam.

Características do produto
O produto endurece depois de misturar.

Aplicação
Tipo de aplicação:
O processamento do P-Cem ocorre à temperatura ambiente. As temperaturas baixas (placa de vidro arrefecida) provocam tempos de processamento mais longos. A relação de mistura entre a pasta base (castanha) e a pasta de catalisador (branco) é de 2 para 1 em relação ao volume (= relação

ET

P-Cem® Tuben

Kasutusjuhend

Patsiendile sihtrühm
Kõik, kelle ravimeetmete on vaja P-Cemi, v. a. liikud, kes on koostisosade, sh eelkõige kolofooniumi suhtes allergilised.

Ettenähtud kasutaja
Hambaarst

Koostis
Peamised koostisosad: Vaikhape ja metalloksiidid

Kvalitatiivsed andmed:
Parafiin, Oleum Arachidis, kaltsiumhüdroksiid, magneesiumoksiid, hüdroksüülapatiit, tsinkoksiid, etanool (lõhnaga), kookospähkli ravihape, kolofooniumi, rõnidioksiid.

Kvantitatiivsed andmed:
Kaltsiumhüdroksiid 2%, kolofooniumi 45%, ravihape 25%, tsinkoksiid 10%.

Toote sihtotstarve
P-Cem on lihtsalt kasutatav, eugenoolivaba hambatsement, mis ei taktsi plastpõhiste tildide- ja kinnitusmaterjalidele kõvastumist.
P-Cem on ideaalselt sobilik eugenooli suhtes allergilistele isikutele. P-Cem sisaldab kaltsiumhüdroksiidi ja hüdroksüülapatiidi hammaste tundlikkuse ja säilitamiseks.

Näidustused
P-Cem on ajutine nakkuv tsement hambakrooni-de ja -sildade jaoks.

Vastunäidustused
Materjal sisaldab kolofooniumi. Kolofooniumi, mnagsiidiidi või muude teiste sisaldus-osate ainete vastu allergilistel patsientidel mitte kasutada.

Toote nõuetajal
Toode kõvastub pärast segamist.

Kasutamine
Kasutusjuhis
P-Cemi töödeldakse toatemperatuuril. Pulbrenat tõõtlusajad on lubatud maadalatel temperatuuril (ühtlustub kuni 23 kraadini). Baas- (pruun) ja katalüsaatorpasta (valge) segamisuhe on 2 : 1 arvestades mahtu (= 1 : 1 massituhe). Seeparast peab baaspasta (pruun) olema ühtlase tilga oleme kuni korda ni pikk kui katalüsaatorpasta tilp. Pastad tuleb kanda segamisplaatile, mis on valmistatud mittemuvast materjalist, või klaasplaadile. Pastat tuleb segada 30 sekundit, kuni saadakse ühtlane värv. Kandke Shuke kiirt sidula soste või sila sisekülgele või kandke peale mäng kõndipeparaat. Arge kandke kunagi kuivadele õõnsitele – need tuleb pärt esmalt niisutada. P-Cemi saab töödelda 1 kuni 2 minutit ja see kõvenab suus täielikult 3 kuni 6 minutiga. Ligikaudu 3 kuni 5 minutit pärast kõvenemist eemaldage ligne materjal.

Täiendavad soovitused
Pehmem materjal ja pikemad töötlusajad saovutatakse väikese koguse P-Cemi baaspasta (pruun) või väikese koguse vaseliini lisamisega. Lisaks lihtsustab niiskus (niisked kõndid) hiljem eemaldamist. Kõvema ja kiiremini nakkuva materjali saab väikese koguse P-Cemi katalüsaatorpasta (valge) lisamise või tsinkoksiidi suurendamisega. Sellise kõvem materjal sobib paremini mitmel või suuel pinnal olevate õõnsitesse ning ajutise pikaajalise (max 1 kuu) tõidste jaoks. P-Cemi jõõgid saab kroonidest hõlpsasmi eemaldada, kui neid kõldoonikumi spreiga.

Tõõtlemisoovitused
Tootle juurdek kuuluvas kasutusjuhendis kirjeldatud tõõtlusoovitusi ja ettevaatusabinõusid tuleb alati järgida. Kui vaatamata nende järgimisele tekivad patsiendil soovimatud reaktsioonid või muud soovimatud juhtumid, andke palun alati meile sellest teada. Kirjeldades täpselt kaasuvaid häiringuid.

Holatused / muud riskid
Toode sisaldab kolofooniumi. Isikud, kes on kolofooniumi suhtes allergilised, ei tohi tootega kokku puutuda.

Tuleb võõtida juurdesegatud hambatsementi kokkupuudet naha või limaskestadega. Kui kokkupuude siiski toimub, tuleb materjal eemaldada alkoholiga immutatud vattitampoonide abil ja kokkupuutekohta tuleb loputada rohke veega. Silmadega kokkupuute korral tuleb avatud silmi loputada rohke veega ja võõta ühendust silmaarstiga.

Riski/kõrvaltoimed
Üleannustamise riskid ei ole teada. Ebasoovitavad kõrvaltoimed ei ole teada.

Koostoimed
Tootе ja selle metaboliitide koostoime teiste meditsiinitoodete, ravimite või muude ainetega ei ole teada.

Säilitamine
P-Cemi tuleb säilitada toatemperatuuril. Sulgege tuubid pärast kasutamist korralikult. Ärge ajage kokke segi.

Säilitusaeg
P-Cemi ei ole lubatud kasutada pärast sällivusaja möödumist.

Variandid

REF WP4010	25 g baaspastat tuubis 25 g katalüsaatorpastat tuubis

Kasutusett kõrvaldamine
Kõvastumata materjal tuleb kasutusett kõrvaldada erijäätmetena.

Kõikidest seoses tootega tekkinud rasketest juhtumitest tuleb teavitada tootjat ja selle liikmesriigi pädevat asutust, kus kasutaja ja/või patsient elavad.

LV

P-Cem® Tubes

Lietošanas instrukcija

Pacientu mērķa grupa
Visi, kuriem P-Cem ir nepieciešams ārstēšanai, izņemot cilvēkus, kuriem ir alerģiska vai paaugstināta jutība pret sastāvdaļām, īpaši kolofoniju.

Paredzētais lietotājs
Zobārsts

Sastāvs
Būtiski komponenti: Sveķu skābe un metāla oksīdi

Kvantitātes dati:
Parafīns, eļļas arachidis, kalcija hidroksīds, magnija oksīds, hidroksiapatīts, cinka oksīds, etanols (dažas), taukskābes no kokosriekstiem, kolofonija, silīcija dioksīds.

Kvantitatīvie dati:
Kalcija hidroksīds 2%, kolofonijs 45%, tauksskābes 25%, cinka oksīds 10%.

Paredzētais izstrādājuma izmantošanas veids
P-Cem ir viegli lietojams cements, kas nesatur eugenolu, un tas neaizkavē plastmasas uzpildes un līmes materiālu sacietēšanu.
P-Cem ir ideāli piemērots pret eugenolu jutīgu cilvēku ārstēšanai. P-Cem sastāv kalcija hidroksīdu un hidroksiapatītu hammaste tundlikkuse ja säilitamiseks.

Indikācijas
P-Cem ir lāsīgās līmējošs cements vainagiem un tiltiem.

Kontrindikācijas
Šis materiāls satur metakrilātu. Neliet0jiet pacientiem ar alerģiju pret metakrilātu vai citām ķīmiskajiem sastāvā esošajām vielām.

Izstrādājuma īpašības
pēc sajaukšanas sacietē.

Pielietojums
Pielietojums
P-Cem apstrādā istabas temperatūrā. Ilgāks apstrādes laiks rada zemu temperatūru (atdzesēšta stikla plāksne). Bāzes (pruna) un katalizatora pastas (balta) sajaukšanās attiecība ļoti tilpuma ir 2 pret 1 (= 1:1 svara attiecība). Tāpēc bāzes pastas ekstrudētajai daļai jābūt dīvieā garākai pear katalizatora pastas virknei. Abas pastas vajadzētu (attēlotās stikla plāksnītē). Bazēs (rudas spalvas) materiāla pastu sacīšanu 30 sekundes, līdz iegūst vienādīgu masu. Uzkāpjet plānu kārtu uz pagaidu vainaga vai tilta vai mitras formas nogulsnēšanas virsmas. Nekad nelietojiet uz sausiem ceimiem, vispirms tos vienmēr samitrinīet. P-Cem var lietot 1 līdz 2 minūtes, un tas sacietē mutē 3 līdz 6 minūšu laikā.
Noņemiet lieko materiālu apmēram 3 līdz 5 minūtes pēc sacietēšanas.

Papildus informācija:
Mīkstāks materiāls vai ilgāks apstrādes laiks tiek sasniegts, pievienojot nedaudz vairāk P-Cem bāzes pastas (brūnas) vai nelielu daudzumu vaseliņa. Turklāt mitrums (siltā cilvēka) atvieglo tā noņemšanu vēlāk. Cietāku un ātrāku cietēšanas materiālu var panākt, pievienojot nedaudz vairāk P-Cem katalizatora pastas (baltas) vai pievienojot cinka oksīdu. Šāds cietāks materiāls ir labāk piemērots vairāku laukumu un lielu kontaktvirsmu aizbūvēm, kā arī īslaicīgiem ilgtermiņa stāgumiem (maksimums 1 mēnesi).
P-Cem efektīvu ar viegli nonemt no vainagiem, apstrādājot tos ar aukstu aerosolu.

Informācijas apstrāde:
Vienmēr ļāvieņoto produkta lietošanas instrukcijā aprakstītie apstrādes norādījumi un piesardzības pasākumi. Ja pacientam ir nevēlama reakcija vai rodas cīti nevēlami notikumi, neraugoties uz to instrukciju ievērošanu, mēs lūdzam jūs ziņot0t par to mums. Lūdzu, pēc iespējas precīzāk aprakstot pavadošos apstākļus.

Brīdinājuma pazīņojumi / atlikušie riski
Šī materiāla satur metakrilātu. Cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret kolofoniju, nevajadzētu nonākt saskarē ar produktu.

Jauktajam cementam nevajadzētu nonākt saskarē ar ādu vai gļotādu. Ja tas tomēr nonāk saskarē, noņemiet materiālu ar spirtu piesūcinātām kokvilnas bumbiņām un noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Ja nokļūst acīs, izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens ar plaši atvērtu plakstiņu un konsultējieties ar oftalmologu.

Riski / Blakusparādības
Nav zināms par nevēlamām blakņēm. Nav zināmu nevēlamu blakusparādību.

Mijiedarbība
Produkta un tā metabolītu mijiedarbība ar citām medicīnas ierīcēm, zālēm vai citām vielām nav zināma.

Uzglabāšana
P-Cem jāuzglabā istabas temperatūrā.
Pēc lietošanas cieši noslēgiet caurules.
Nesajauciet aizbāžņus.

Derīguma termiņš
Neliet0jiet P-Cem pēc derīguma termiņa beigām.

Varianti

REF WP4010	25 g bāzes pastas mēģenē 25 g katalizatora pastas mēģenē

Likvidācija
Cietais materiāls jāizņīcina kā bīstami atkritumi.

Par visiem nopietniem incidentiem, kas notikuši saistībā ar produktu, jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā ir reģistrēts lietotājs un / vai pacients.

LT

P-Cem® Tūbelės

Naudojimo instrukcija

Tikslinė pacientų grupė
Visiems, kuriems reikalingas gydymas „P-Cem“, išskyrus sudedamosiems dalims alergiškus asmenis, pirmiausiai tuos, kuriems pasireiškia alerginė reakcija į kanifolįjų.

Numatytì naudotojai
Odontologas

Sudėtis
Pagrindinės sudedamosios dalys: kanifolijos rūgštys ir metalo oksidai

Kokybiniai duomenys:
parafinas, žemės riešutų aliejus, kalcio hidroksidas, magnio oksidas, hidroksiapatitas, cinko oksidas, etanolis (pėdsakai), riebalų rūgštys iš kokoso riešuto, kanifolija, silicio dioksidas.

Kiekybiniai duomenys:
kalcio hidroksidas 2%, kanifolijų 45 %, riebalų rūgštys 25 %, cinko oksidas 10 %.

Numatytas produkto naudojimas
„P-Cem“ yra patogiai naudojamas cementas, kuris sudėtyje neturi eugenolio, kuris neslopina užpildančios bei tvirtinimomo medžiagos plastiko pagrindo stingimo.
Jeigu pacientas alergiškas eugenoliui, „P-Cem“ nenaudokite. „P-Cem“ sudėtyje yra kalcio hidroksido ir hidroksiapatito dantims apsaugoti ir išsaugoti.

Indikacijos
„P-Cem“ naudojamas kaip laikinas tvirtinantis cementas karūnėlėms ir tiltams.

Kontraindikacijos
Medžiagoje yra kanifolijos. Negalima naudoti pacientams, kurie yra alergiški kanifolijai, bemės riešuty alieju arba kitoms produkto sudėtyje esančioms medžiagoms.

Produkto savybės, produktas
sumaišius stingsta.

Naudojimas
Naudojimo būdas:
„P-Cem“ apdorokite kambario temperatūroje, ilgesnė apdorojimo trukmė pasieklama esant žemesnei temperatūrai. (užaušinamo ne vandens plokštelė). Bazės (rudas spalvos) ir katalizatoriaus pastos (balta spalvos) maišymo santykis yr 1:1 (= 1 tūris prie tūrio = 1 ilgio prie ilgio = 1 svorio santykis). Tadėl išspausta bazės juostelė turi būti dvigubai ilgesnė negu katalizatoriaus pastos juostelė. Abi pastas užtepkite ant maišymo bloko iš nesiabsorbuojančio medžiago arba ant stiklo plokštelės. Pasta maišykite maždaug 30 sekundžių, kol masė taps vientisa. Ploną sluoksnį užtepkite vidinėje laikinosios karūnėlės arba tilto pusėje arba dėkite ant kontaktinio paviršiaus ruošinio. Niekada nenaudokite ant sauso kontaktinio paviršiaus, visuomet ji pirmiausiai sudrėkinkite.
„P-Cem“ apdorojimui 1–2 minutės ir stingsta burnoje per 3–6 minutes.
Praėjus maždaug 3–5 minutėms nuo sukietėjimo, perteklię medžiagą pašalinkite.

Papildomai nurodymai:
minkštesnę medžiagą ir ilgesnę apdorojimo trukmę ilgiausiai dar šiek tiek pridėdami „P-Cem“ bazės pastos (rudos spalvos) arba pridėję šiek tiek vazelino. Be to, drėgmė (dėngti kontaktinėje aplinkoje) palengvina vėlesnį pašalinimą. Kietesnę ir greičiau prikimbančią medžiagą gausite jdėję šiek tiek daugiau „P-Cem“ katalizatoriaus pastos (baltos spalvos) arba įmaišę cinko oksido. Tokia kietesnė medžiaga yra geresnė didesnio ploto ertmėms bei prieinamoji trijų ligiškaliomis uždarkinės (ligiausiai 1 mėnesiui). „P-Cem“ lliuolius nesudėtinga pašalinti iš karūnėlės apipurkiant šalto oro srove.

Nurodymai dėl apdorojimo:
visuomet atsižvelkite į gaminiui priklausančioje naudojimo instrukcijoje aprašytus nurodymus dėl apdorojimo bei atsargumo priemones. Vis dėlto, jeigu ir laikantis šio nurodymo pacientams pasireiškia nepageidaujamu reakcija arba įvyksta kiti nepageidaujami įvykiai, bet kokiu atveju, prašome informuoti, patėikiant tiksly aplinkybių aprašymą.

Įspėjamieji nurodymai / liekamoji rizika
Gaminyje yra kanifolijos. Asmenys, kurie alergiški kanifolijai, neturėtų turėti jokio sąlyčio su produktu.

Reikėty vengti sumaišyto cemento sąlyčio su oda arba gleivine. Jeigu vis dėl to sąlytis buvo, medžiagą pašalinkite naudodami alkoholiu sudrėkintą vatos tamponą ir gausiai nuskalaukite vandeniu. Jeigu buvo sąlytis su akimis, reikia gausiai skalauti vandeniu atvertus voką ir kreiptis į okulistą.

Rizika / šalutiniai poveikiai
Rizika, kylanti dėl perdozavimo nėra žinoma. Šalutiniai poveikiai nėra žinomi.

Sąveika su kitomis medžiagomis
Produkto ir jo metabolitų sąveika su kitais medicinos produktais, vaistais ar kitomis medžiagomis nėra žinoma.

Laikymas
„P-Cem“ laikykite kambario temperatūroje. Tūbelę panaudoję tinkamai uždarykite. Nesupainiokite uždorių.

Geriausias iki
Pasibaigus galiojimo laikui, „P-Cem“ nenaudokite.

Galimi variantai

REF WP4010	25 g bazės pasta tūbelėje 25 g katalizatoriaus pasta tūbelėje

Šalinimas
Nesutinguoja medžiaga reikėty mesti į specialiąsias atliekas.

Apie visus rimtus su gaminiu susijusius incidentus reikia pranešti gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra registruotas vartotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

BG

P-Cem® Тубички

Ръководство за употреба

Целева група пациенти
Всички, за които лечение се изисква P-Cem, с изключение на лица, алергични към съставките, в случая по-специално колофон.

Целевият потребител
Зъболекар

Състав
Основни компоненти: Смоластa киселина и метални оксиди

Качествени данни:
парафин, фъстъчено масло, калциев хидроксид, магнезиев оксид, хидроксиапатит, цинков оксид, етанол (в следи), мастни киселини от кокос, колофон, синилиев диоксид.

Количествени данни:
калциев хидроксид 2%, колофон 45%, мастни киселини 25%, цинков оксид 10%.

Предназначение на продукта
P-Cem е лесен за напозване цимент без евгенол, който не възпрепятства втвърдяването на материали за пълнеж и улавяване на пластмасова основа.
P-Cem е показан при алергия към евгенол. P-Cem съдържа калциев хидроксид и хидроксиапатит за защита и запазване на зъбите.

Предупредителни указания/Остатъчни рискове
Продуктът съдържа колофон. Лица, които са сенсетивни към колофон, не трябва да влизат в контакт с продукта.

Да се избягва контакт на сместа преди цимент с кожата или лигавицата. Ако материалът все пак влезе в контакт, го отстранете с напоени с алкохол тампони памук и изплакнете обилно с вода. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с широко отворена клепач и потърсете офталмолог.

Рискове/странични ефекти
Не са известни рискове от предозиране. Не са известни нежелани реакции.

Взаимодействие с други лекарства
Не е известно взаимодействие на продукта и неговите метаболити с други медицински продукти, лекарства или други вещества.

Съхранение
P-Cem следва да се съхранява при стайна температура.
След употреба затворете тубите плътно.
Не разменяйте капачките.

Срок на годност
Не използвайте P-Cem след срока на годност.

Варианти

REF WP4010	25 g паста за основа в туба 25 g катализаторна паста в туба

Отстраняване като отпадък
Неотвърдената материя трябва да се изхвърли като опасен отпадък.

Всеки сериозен инцидент във връзка с продукта трябва да се докладва на производителя и на компетентния орган на държавата членка, в която потребителят и/или пациентът е установен.

HR

P-Cem® Tube

Uputa za uporabu

Ciljna skupina pacijenata
Svi za čije je liječenje potreban P-Cem, osim osoba koje su alergične na sastojke, u ovom slučaju prvenstveno na kolofonij.

Predviđeni korisnici
Stomatolozi

Sastav
Glavni sastojci: smola kiselina i metalni oksidi

Kvalitativni podatci:
parafin, ulje kikirikija (oleum arachidis), kalcijev hidroksid, magnezijev oksid, hidroksiapatit, cinkov oksid, etanol (u tragovima), kokosmasnim kiselinama (čvrsti), silicijev dioksid.

Kvantitativni podatci:
2 % kalcijeva hidroksida, 45 % kolofonija, 25 % masnih kiselina, 10 % cinkova oksida.

Namjena proizvoda
P-Cem je cement bez eugenola jednostavan za upotrebu koji ne ometa stvrdnjavanje materijala za ispune i prečvršćivanje na bazi plastike.
P-Cem je indiciran u slučaju alergija na eugenol. P-Cem sadrži kalcijev hidroksid i hidroksiapatit za zaštitu i očuvanje zuba.

Indikacije
P-Cem je privremeni prićvrsni cement za krunice i mostove.

Kontraindikacije
Materijal sadrži kolofonij. Ne upotrebljavati kod pacijenata alergičnih na kolofonij, ulje kikirikija ili druge tvari sadržane u proizvodu.

Značajke proizvoda
Proizvod se stvrdnjava nakon miješanja.

Primjena
Način primjene:
P-Cem se upotrebljuje pri sobnoj temperaturi. Pri nižim temperaturama (ohlađena staklena ploča) obrada traje dulje. Omjer miješanja baze (smeđe) i katalizatorske (bijele) paste iznosi 2 naprama 1 u odnosu na obujam (= omjer mase iznosi 1 naprama 1). Stoga istisnuti komadić baze paste mora biti otprilike dvaput duži od istisnutog komadića katalizatorske paste. Obje paste potrebno je nanijeti na blok za miješanje od neupijajućeg materijala ili staklenu ploču. Miješati pastu otprilike 30 sekundi dok ne nastane homogena smjesa. Nanijeti tanak sloj gdjelke preparacijske površine krunice ili mosta ili preparata za mokru matricu (kočić). Nikada ne upotrebljavati na suhoj površini – uvijek ih prvo navlažite. P-Cem se može koristiti 1 do 2 minute, a u ustima se stvrdnjava za 3 do 6 minuta.
Ukloniti višak materijala približno 3 do 5 minuta nakon stvrdnjavanja.

Dodatne napomene:
Veća mekoća materijala i produljeno vrijeme za obradu postiže se dodavanjem veće količine bazne P-Cem paste (smeđe) ili male količine vazelina. Osim toga, vlaga (navlažen zub) pripomaže lakšem uklanjanju. Tvrđi i brže stvrdnjavajući materijal može se postići dodavanjem veće količine katalizatorske P-Cem paste (bijele) ili dodavanjem cinkovog oksida. Takvo tvrđi materijal pogodniji je za više površine i kraće vrijeme obrade (najviše mjesec dana). Ostaci P-Cema mogu se lagano ukloniti s krunica tako da se raspršuju rashladnim raspršivačem.

Napomene za obradu:
Mjere za obradu opisane u uputama za upotrebu proizvoda te mjere opreza obvezno se moraju poštivati. Ako unatoč poštivanju tih napomena dode do neželjene reakcije kod pacijenta ili drugih neželjenih pojava, obvezno ih prijavite uza što točniji opis popratnih okolnosti.

Sigurnosne napomene / ostali rizici
Proizvod sadrži kolofonij. Osobe alergične na kolofonij ne bi smjele dospjeti u dodir s proizvodom.

Potrebno je izbjegavati dodir pripremljenog cementa s kožom ili sluznicom. Ako ipak dode do dodira, materijal je potrebno ukloniti vatom natopljenom u alkoholi i isprati obilnom količinom vode. U slučaju dodira s očima otvorene oči ispirati obilnim količinom vode i potražiti savjet oftalmologa.

Rizici/nuspojave
Rizici povezani s predoziranjem nisu poznati. Neželjene nuspojave nisu poznate.

Interakcije
Interakcije proizvoda i njegovih metabolita s drugim medicinskim proizvodima, ljekovima ili drugim tvarima nisu poznate.

Skladištenje
P-Cem je potrebno čuvati pri sobnoj temperaturi.
Nakon upotrebe tube potrebno ju je čvrsto zatvoriti.
Poklopci se ne smiju pomiješati.

Rok trajanja
P-Cem se ne smije nastaviti upotrebljavati nakon isteka roka trajanja.

Varijante

REF WP4010	25 g bazne paste u tubi 25 g katalizatorske paste u tubi

Zbrinjavanje
Nestvrdnuti materijal zbrinuti kao poseban otpad.

Sve značajne pojave povezane s proizvodom potrebno je prijaviti proizvođaču i nadležnim tijelima države članice poslovnog nastana korisnika i/ili prebivališta pacijenta.

RO

P-Cem® Tuburi

Instrucțiuni de utilizare

Grupul țintă de pacienți
Toate persoanele pentru care P-Cem este necesar pentru tratament, cu excepția persoanelor care sunt alergice la ingrediente, în special la colofoniu.

Utilizatorul destinat
Medical stomatology

Compoziție
Elementele constitutive: Acizi de rășină și oxizi metalici

Date calitative:
Parafină, Oleum Arachidis, hidroxid de calciu, oxid de magneziu, hidroxiapatită, oxid de zinc, etanol (urme), acizi grași din nucă de cocos, colofoniu, dioxid de siliciu.

Cantitativ podatci:
2 % calciieva hidroksida, 45 % kolofonija, 25 % masnih kiselina, 10 % cinkova oksida.

Scopul prevăzut al produsului
P-Cem este un ciment lipsit de manevrat, fără eugenol, care nu inhibă solidificarea materialelor de umplere și fixare pe bază de mase plastice.
În caz de alergii la eugenol, este indicat P-Cem. P-Cem conține hidroxid de calciu și hidroxiapatită pentru protecția dinților și menținerea dinților.

Indicații
P-Cem este un ciment adeziv temporar pentru coroane și punți.

Contraindicații
Materialul conține colofoniu. Nu utilizați la pacienți cu alergie la colofoniu, ulei de arahide sau alte substanțe conținute în produs.

Caracteristicile produsului
Produsul se solidifică după amestecare.

Utilizare
Metoda de aplicare:
Prelucrarea P-Cem are loc la temperatura camerei. Timpii de procesare mai lungi (pe o placă de sticlă răcită). Raportul de amestecare al pastei de bază (maro) și catalizatorului (alb) este de 2 la 1. În ceea ce privește volumul (= 1 la 1 raport de greutate). Prin urmare, compoziția de bază a pastei ieșite trebuie să fie de două ori mai lungă decât componenta pastei catalizator. Aplicați ambele paste pe un bloc de amestecare din material neabsorbant sau pe o placă de sticlă. Se amestecă timp de aproximativ 30 de secunde până când se formează o masă omogenă. Aplicați un strat subțire pe interiorul coroanei temporare sau al punții sau al preparației umed al bontului. Nu folosiți niciodată pe o suprafață uscată, umeziți-le întotdeauna înainte. P-Cem poate fi procesat timp de 1 până la 2 minute și e solidificăi în gură în 3 până la 6 minute.
Aproximativ 3 până la 5 minute după solidificare, îndepărtați excesul de material.

Note suplimentare:
Materialul mai moale și timpii de procesare extinși se obțin adăugând puțin mai multă pastă de bază P-Cem (maro) sau o cantitate mică de vaselină. În plus, umiditatea (bonturi umede) facilitează mai târziu îndepărtarea. Un material mai dur și cu întărire mai rapidă se obține adăugând puțin mai multă pastă catalizator P-Cem (albă) sau prin adăugarea de oxid de zinc. Un astfel de material mai dur este mai potrivit pentru cavități și suprafețe multiple și mare, precum și pentru lucrările provizorii pe termen lung (maximum 1 lună). Resturile de P-Cem pot fi îndepărtate cu ușurință din coroane prin tratarea acestora cu un spray rece.

Indicații de prelucrare:
Instrucțiunile de prelucrare descrise în instrucțiunile de utilizare care aparțin produsului, precum și măsurile de precauție trebuie respectate în orice caz. În cazul în care în pofida respectării acestor indicații există o reacție nedorită a pacientului sau alte evenimente nedorite, solicităm, în orice caz, notificarea cu descrierea cât mai precisă a circumstanțelor însoțitoare.

Avertismente/riscuri reziduale
Produsul conține colofoniu. Persoanele care au o alergie la colofoniu nu trebuie să vină în contact cu produsul.
Trebuie evitat contactul cimentului amestecat cu pielea sau mucoasa. În caz de contact, materialul trebuie îndepărtat cu ghemotoace de bumbac îmbibate cu alcool și clătit cu multă apă. În caz de contact cu ochii, clătiți cu multă apă cu spatiul pleoapelor deschis și consultați un oftalmolog.

Riscuri/efecte secundare
Riscurile supradozajului nu sunt cunoscute. Nu se cunosc reacții adverse nedorite.

Interacțiuni medicamentoase
Nu se cunoaște o interacțiune medicamentoasă a produsului și a metaboliților săi cu alte dispozitive medicale, medicamente sau alte substanțe.

Depozitare
P-Cem trebuie păstrat la temperatura camerei.
Închideți bine tuburile după utilizare.
Nu schimbați capacele între ele.

Termen minim de valabilitate
Nu utilizați P-Cem după data de expirare.

Variante

REF WP4010	25 g pastă de bază în tub 25 g pastă catalizator în tub

Eliminarea ca deșeu
Materialele nesolidificate trebuie eliminate la deșeuri speciale.

Toate incidentele grave apărute în legătură cu produsul vor trebui să fie raportate producătorului și autorității competente a statului membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.

SK

P-Cem® Tuby

Návod na použitie

Pacientska cieľová skupina
Všetky osoby, u ktorých sa vyžaduje liečba s P-Cem, s výnimkou osôb alergických na zložky, najmä na kolotónium.

Predpokladaný používateľ
Zubný lekár

Zloženie
Základné komponenty: Živicová kyselina a oxidy kovov

Kvalitatívne údaje:
Parafín, arašidový olej, hydroxid vápenatý, oxid horečnatý, hydroxyapatit, oxid zinočnatý, etanol (stopy), mastné kyseliny z kokosu, kolofónium, oxid kremičitý.

Kvantitatívne údaje:
Hydroxid vápenatý 2 %, kolofónium 45 %, mastné kyseliny 25 %, oxid zinočnatý 10 %.

Účel a určenie výrobku
P-Cem je ľahko použiteľný cement bez obsahu eugenolu, ktorý nebráni vytvrdzovaniu výplňových a fixačných materiálov na báze plastov.
P-Cem je indikovaný na alergiu na eugenol.
P-Cem vsebuje kalcijev hidroksid in hidroksilni apatit za zaščito in ohranitev zob.

Indikácie
P-Cem je dočasne lepiaci cement na korunky a mosty.

Kontraindikácie
Materiál obsahuje kolofónium. Nepoužívať u pacientov s alergiou na kolofónium, arašidový olej alebo iné látky obsiahnuté v produkte.

Vlastnosti produktu
Produkt po zmiešaní stuhne.

Použitie
Typ použitia:
P-Cem sa spracováva pri izbovej teplote. Dlhšie doby spracovania vznikajú pri nižších teplotách (ochladená sklenená doska). Pomer miešania bázy (hnedá) a pasty katalyzátora (biela) je objemovo 2:1 (= hmotnostný pomer 1:1). Preto by mal byť vytlačený prameň základnej pasty približne dvakrát dlhší ako prameň pasty katalyzátora. Obe pasty naneste na miešaciu podložku z nenasiakavého materiálu alebo na sklenenú dosku. Pastu miešajte asi 30 sekúnd, kým nezískate homogénnu hmotu. Naneste tenkú vrstvu na vnútornú stranu dočasnej korunky alebo mostíka alebo na mokrú preparáciu kýpete zuba. Nikdy nepoužívajte na suché kýpete zuba – vždy ich najskôr navlhčite. P-Cem sa môže spracovávať 1 až 2 minúty a vytvrdzuje v ústach za 3 až 6 minút.
Asi 3 až 5 minút po vytvrdnutí odstráňte prebytočný materiál.

Ďalšie informácie:
Mäkší materiál a dlhšie doby spracovania je možné dosiahnuť pridaním tractu veľa základnej pasty P-Cem (hnedá) alebo malého množstva vazelíny. Okrem toho vlhkosť (vlhké kýpete zuba) uľahčuje neskoršie odstránenie. Tvrdší a rýchlejšie tuhnúci materiál sa dá dosiahnuť pridaním trochu viac pasty katalyzátora P-Cem (biela) alebo pridaním oxidu zinočnatého. Takýto tvrdší materiál je vhodnejší pre viacplošné a veľkoplošné dutiny, ako aj pre dočasné dlhodobé úžywy (maximálne 1 mesiac). Zvyšky P-Cem sa dajú ľahko odstrániť z koruniek ošetrením studeným sprejom.

Informácie o spracovaní:
Vždy musíte dodržiavať pokyny na spracovanie a preventívne opatrenia popísané v návode na použitie, ktorý patrí k produktu. Ak by pacient napriek dodržiavaniu týchto pokynov zažil nežiaduce alergické alebo iné nežiaduce udalosti, žiadame vás, aby ste nás o každom prípade informovali a čo najpresnejšie opísali sprievodné okolnosti.

Varovné oznámenia/Zvyškové riziká
Produkt obsahuje kolofónium. Ľudia, ktorí sú alergickí na kolofónium, by nemali prísť do styku s produktom.

Zabráňte kontaktu zmiešaného cementu s pokožkou alebo sliznicami. Ak napriek tomu dôjde ku kontaktu, odstráňte materiál pomocou vatových tampónov nasiaknutých alkoholom a opláchnite veľkým množstvom vody. V prípade kontaktu s očami ich vypláchujte veľkým množstvom vody s otvorkou otvoreným viečkom a vyhľadajte očného lekára.

Riziká/Vedľajšie účinky
Nie sú známe žiadne riziká predávkovania. Neželané vedľajšie účinky nie sú známe.

Interakcie
Interakcie výrobku a jeho metabolitov s inými zdravotníckymi výrobkami, liekmi a inými látkami nie sú známe.

Skladovanie
P-Cem by sa mal skladovať pri izbovej teplote. Po použití tuby pevne uzavrite.
Nezamieňajte uzávery.

Minimálna trvanlivosť
Nepoužívajte P-Cem po dátume exspirácie.

Varianty

REF WP4010	25 g základnej pasty v tube 25 g katalyzátorovej pasty v tube

Likvidácia
Nevytvrdený materiál by sa mal zlikvidovať ako špeciálny odpad.

Všetky závažné udalosti, ktoré sa vyskytli v súvislosti s týmto výrobkom, treba nahlásiť výrobcovi a príslušnému úradu členského štátu, kde má svoje sídlo/svoj pobyt používateľ a/alebo pacient.

SL

P-Cem® Tube

Navodila za uporabo

Ciljna skupina pacientov
Vsi, za katere je za ustavljenje potreben P-Cem, razen za osebe, ki so alergične na sestavine, zlasti kolofonijo.

Predvideni uporabnik
Zobozdravnik

Sestava
Bistvene sestavine: smolna kislina in kovinski oksid

Kvalitativni podatki:
parafin, arašidovo olje (oleum arachidis), kalcijev hidroksid, magnezijev oksid, hidroksiapatit, cinkov oksid, etanol (sledi), maščobne kisline iz kokosa, kolofonija, silicijev dioksid.

Kvantitativni podatki:
2 % kalcijeva hidroksida, 45 % kolofonija, 25 % masnih kislin, 10 % cinkova oksida.

Namembnost izdelka
P-Cem je enostaven za uporabo, cement brez evgenola, ki ne zavira strjevanja polnilnih materialov na osnovi plastike.
P-Cem je indiciran pri evgenolu.
P-Cem vsebuje kalcijev hidroksid in hidroksilapatit za zaščito in ohranitev zob.

Indikacije
P-Cem je primeren za začasni lepilni cement za krone in mostove.

Kontraindikacije
Material vsebuje kolofonijo. Ne uporabljajte pri pacientih z alergijo na kolofonijo, arašidovo olje ali druge snovi, ki jih vsebuje izdelek.

Značilnosti izdelka
Izdelek se po mešanju strdi.

Uporaba
Način uporabe:
P-Cem se obdeluje pri sobni temperaturi. Čas obdelave se podaljša pri nižjih temperaturah (ohlajena steklena plošča). Mešalno razmerje baze (rjave) in katalizatorske paste (bele) je 2 proti 1 glede na prostornino (= 1:1 utežno razmerje). Zato mora biti iztisnjeni pramen osnovne paste dvakrat daljši od pramena katalizatorske paste. Obe pasti nanesite na blok za mešanje iz nevpojnega materiala ali stekleno ploščo. Paste premešajte približno 30 sekund, dokler ne dobite homogene mase. Na notranjo stran začasne krone ali mosta ali škrbino zoba nanesite tanek sloj. Nikoli ne uporabljajte na suhih škrbinah zoba, vedno jih najprej navlažite. P-Cem lahko uporabljate 1 do 2 minuti, v ustih pa se strdi v 3 do 6 minutah.
Odvečni material odstranite približno 3 do 5 minut po strjevanju.

Dodatne informacije:
Mehkejši material in daljši čas obdelave je mogoče doseči z dodajanjem malo več P-Cem osnovne paste (rjave) ali majhne količine vazelina. Poleg tega vlaga (vlažne škrbine zoba) pozneje olajša odstranjevanje. Trši in hitrejši strjevalni material je mogoče doseči z dodajanjem malo več P-Cem katalizatorske paste (bele) ali z dodajanjem cinkovega oksida. Tak trši material je bolj primeren za kavitete z več površinami in velike površine ter začasno dolgotrajna polnila (največ 1 mesec). Ostanke P-Cema je enostavno odstraniti s krun, tako da se obdelujo s hladnim razpršilom.

Informacije za obdelavo:
Vedno je treba upoštevati navodila za obdelavo in previdnostne ukrepe, opisane v navodilih za uporabo, ki pripadajo izdelku. Če pacient kljub skladnosti s temi navodili doživi nežeieno reakcijo ali druge nežeiene dogodke, vas prosimo, da nas v vsakem primeru obvestite s čim natančnejšim opisom spremljajočih okoliščin.

Opozorila/preostala tveganja
Izdelek vsebuje kolofonijo. Ljudje, ki so alergični na kolofonijo, ne smejo priti v stik z izdelkom.

Mešani cement ne sme priti v stik s kožo ali sluznico. Če pride do stika, odstranite material z alk